

8	Usia ibu saat hamil bisa menjadi penyebab terjadinya <i>stunting</i>		
9	Anak tidak mudah sakit, pertumbuhan otak baik, anak tidak mudah sakit, anak mengalami perkembangan normal dan sehat adalah fungsi makanan bergizi bagi balita		
10	Perkembangan otak terganggu, kecerdasan menurun, dan mudah terkena penyakit adalah diantara dampak <i>stunting</i>		
11	Anak usia kurang dari 6 bulan sebaiknya cukup diberi ASI tanpa tambahan makanan maupun minuman		
12	Dampak jangka panjang dari <i>stunting</i> adalah meningkatnya resiko terjadinya penyakit diabetes pada anak di masa yang akan datang		
13	Anak usia kurang dari 6 bulan juga boleh diberikan makanan tambahan asalkan berbentuk makanan lunak seperti pisang		
14	Makanan yang baik untuk balita adalah yang mengandung cukup gizi		
15	Kecukupan gizi balita tergantung dari jumlah makanan yang dikonsumsi		
16	Anak usia 7 bulan sudah dapat diberikan makanan padat		
17	ASI sebaiknya diberikan sampai anak berusia 5 tahun		
18	Memberikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A adalah salah satu bentuk pencegahan <i>stunting</i>		
19	Protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan air adalah zat-zat pembangun tubuh		
20	Zat nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak adalah protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin dan air		